

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ РУКАВИЧКИ: піраміда B003

СТЕРИЛЬНІ

Під час пологів; будь-яких хірургічних та інвазивних рентгенологічних процедур; доступу до судин і маніпуляцій з ними (центральна лінія); приготування препаратів для повного парентерального харчування і хіміотерапевтичних засобів

НЕСТЕРИЛЬНІ (ОГЛЯДОВІ)

Прямий контакт із пацієнтом

Контакт з кров'ю, слизовими оболонками, пошкодженою шкірою; за наявності патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів; встановлення й видалення внутрішньовенних приладів; забір крові; роз'єднання систем для внутрішньовенного вливання; обстеження органів порожнини таза і піхви; санація трахеобронхіального дерева у пацієнтів на ШВЛ з відкритим дихальним контуром; епідемічні та надзвичайні ситуації

Непрямий контакт із пацієнтом

Спорожнення ємкостей із блювотними масами; обробка й очищення інструментів; поводження з відходами; очищення місць, на які пролили біологічні рідини

НЕ ВИКОРИСТОВУЄМО

(за винятком контактних запобіжних заходів)

Прямий контакт із пацієнтом

Вимірювання артеріального тиску, температури й пульсу; підшкірні та внутрішньом'язові ін'єкції; миття і переодягання пацієнта; транспортування пацієнта; догляд за очима й вухами (за відсутності виділень); будь-які маніпуляції із судинними системами (за відсутності крові)

Непрямий контакт із пацієнтом

Використання телефону; заповнення історій хвороби; видача пероральних медикаментів; роздача і збір підносів з їжею; збір і заміна постільної білизни; встановлення неінвазивного вентиляційного обладнання і кисневих канюль; переміщення меблів пацієнтів

Примітка. Контактні запобіжні заходи призначені для профілактики інфекцій, які передаються під час прямого і непрямиго контакту з пацієнтом чи об'єктами в його оточенні. Застосовуйте такі заходи для пацієнтів з інфекціями, спричиненими мультирезистентними мікроорганізмами, а також якщо у пацієнтів є рясні виділення з рани, діарея або інші виділення, за яких збільшується ризик передачі інфекції.