

Батьки вагаються: чи робити дитині вакцинацію. Лікарі впевнені - щеплення потрібні. Статистика свідчить, що вакцинація щороку рятує життя мільйонам малят у всьому світі. Щоправда, щоб щеплення було на користь, слід поставитися до нього відповідально. Потрібно дотриматися всіх норм: від врахування протипоказань до спостереження за здоров'ям дитини після процедури. На що звернути увагу батькам під час вакцинації – далі.

Які існують протипоказання до вакцинації?

Найперше протипоказання вакцинації - гостре захворювання або загострення хронічних захворювань. Не можна робити щеплення при серйозній алергічній реакції на попередню дозу вакцини чи при алергії на один із її компонентів. Наприклад, на желатин або курячий білок.

Протипоказана вакцинація людям з захворюваннями, при яких імунітет може не сформуватися. Наприклад, в умовах хіміотерапії, вживанні великих доз стероїдних гормонів, СНІДі. Для таких людей безпечні інактивовані вакцини, які не містять живого вірусу чи бактерії.

Дітям з неконтрольованою епілепсією не рекомендовано вводити цілюноклітинні вакцини проти кашлюка.

Наявність протипоказань визначається індивідуально для кожної дитини. Якщо малеча пропустила щеплення через протипоказання, можна продовжити курс вакцинації в подальшому за графіком, який визначить лікар.

Про що потрібно сказати лікарю до вакцинації?

Вам обов'язково слід поінформувати лікаря, якщо вам здається, що дитина хвора. Слід сказати спеціалісту, чи є у дитини алергія на медичні препарати, продукти харчування або вакцини. Розказати, чи була серйозна реакція на вакцинацію в минулому. Чи були астма, хвороби легенів, серця, нирок, діабет, хвороби крові, хронічні захворювання, судоми. Важливо, чи проходила дитина променеву терапію, чи приймала препарати, що пригнічують імунітет - стероїди, препарати для лікування раку.

Повідомте лікаря, чи переливали дитині кров або продукти крові, імуно (гамма) глобулін. Розкажіть, якщо вона приймає якісь ліки та отримувала будь-які вакцини протягом останніх 4-х тижнів.

На що звернути увагу після вакцинації?

Іноді щеплення, що захищають дитину від інфекцій, можуть викликати тимчасовий дискомфорт. Наприклад, підвищення температури. У такому разі дайте жарознижувальне без вмісту аспірину - ту дозу, яка відповідає віку дитини. Давайте пити багато рідини.

Не одягайте на дитину забагато речей і не загортайте у кілька ковдр. Температура у кімнаті повинна бути близько +22 градусів.

Повідомте лікарю про підвищення температури чи інше погіршення стану дитини.

Коли слід негайно звернутися за медичною допомогою?

Негайно звертайтеся за медичною допомогою, якщо:

- у дитини температура тіла 39 градусів та вище;
- вона виглядає незвичайно блідою, стала млявою та пасивною;
- дитина безупинно плаче впродовж 3 годин і більше;
- дитина тремтить, здригається чи у неї почалися судоми;
- відмовляється від їжі, блює.

До приходу лікаря не панікуйте. При підвищеній температурі дайте жарознижувальне. Заспокоюйте малечу, тримайте під рукою медичну картку дитини - виписки, консультативні висновки, зроблені раніше.